



FINALIDAD

- ✓ *Tetranychus urticae*
(Acaros, Araña roja)



CONSEJOS

Cada larva puede consumir 5 adultos de araña roja o 20 huevos diarios.

Rotar el bote en posición horizontal para homogeneizar el contenido. Abrir el bote y esparcirlo directamente por encima de las hojas.

+34 965 875 045

www.jardinsostenible.eu
info@biocontrol.es

PHYTOSEIULUS PERSIMILIS

AMBLYSEIUS CALIFORNICUS

Phytoseiulus persimilis es el enemigo natural más conocido y empleado en el control de araña roja de numerosos cultivos porque **solo se alimenta de ella**. Actúa en condiciones ideales de humedad relativa elevada y rango de temperatura en torno a los 20-25 °C. ***Amblyseius californicus***, al ser **autóctono** de la costa mediterránea resiste a temperaturas más elevadas que el *P. persimilis* y puede trabajar en ambientes más secos. También sobrevive sin problemas durante el invierno

Envasados: Cilindros con contenido de uno de los dos ácaros fitoseidos. Disponibilidad desde 2000 hasta 10.000 depredadores naturales para unidad, con fecha de caducidad.

Principales cultivos afectados: Es un ácaro polífago que se puede alimentar de cientos de tipos de plantas incluyendo la **mayoría de las hortalizas y ornamentales**. Durante el verano, *T. urticae* tiene una coloración marrón verdosa con dos manchas más oscuras en los laterales, cuando se aproxima el invierno, su coloración se aproxima al rojo intenso.

Conservación: almacenar un máximo de 48 horas tras su recepción sin exponer a la luz solar, en lugar ventilado y a temperatura 15-18 °C.