



DOEL

- ✓ *Dactylopius coccisipúlidos* (wolluis)
- ✓ *Planococcus citri*
- ✓ *Panococcus ficus*
- ✓ *Coccoideos*



TIPS

De toepassing is eenvoudig:

Haal de larven uit de doos en hang 2-3 katoenen zakken direct in boom of struik.

De temperatuur moet minstens 16°C zijn om zich ervan te verzekeren dat de larven meteen actief worden op het moment dat ze opgehangen worden.

+34 965 875 045

www.jardinsostenible.eu

info@biocontrole.es

CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI

De *wolluis* is een parasiterend insect dat in de hele wereld (behalve de polen) voorkomt. Het heeft een voorkeur voor een warm en vochtig klimaat. Het **is een echte plaag** omdat het zich met sap voedt dat het zelf uit de plant haalt. *C. Montrouzieri* in al zijn stadia is een **natuurlijke vijand voor cochinealidae**: de volwassen kevers voeden zich met alle levensfasen en de jonge larven hebben een voorkeur voor de eitjes. Een larf eet meer dan 250 larven van wolluizen gedurende zijn ontwikkeling tot volwassen insect.

Verpakking: geleverd als pakket van 100 larven: gebruik 2-3 insecten per m².

Belangrijkste aangetaste gewassen: Richt veel schade aan bij **diverse gewassen** zoals jonge planten, bloemen en fruit. De insecten verspreiden zich over de hele plant, inclusief de wortels (deze kunnen gemakkelijk bereikt worden als er een mierenhoop in de buurt is, dat als 'hotel' dient).

Conservering: Kan korte tijd worden opgeslagen bij 10-15 ° C en een relatieve vochtigheid groter dan 85%.

Cryptolaemus montrouzieri is actiever als de zon schijnt: de insecten raken verward bij temperaturen tussen 33 °C en 35 °C kunnen geen voedsel vinden.